



Composition

Pritli 150 Tablet: Each tablet contains Ursodeoxycholic Acid Ph. Eur. 150 mg.

Pritli 300 Tablet: Each tablet contains Ursodeoxycholic Acid Ph. Eur. 300 mg.

Pharmacology

Ursodeoxycholic Acid, a naturally occurring hydrophilic bile acid, derived from cholesterol, is present as a minor fraction of the total human bile acid pool. Oral administration of Ursodeoxycholic Acid increases this fraction in a dose-related manner, to become the major biliary acid, replacing/displacing toxic concentrations of endogenous hydrophobic bile acids that tend to accumulate in cholestatic liver disease. In addition to the replacement and displacement of toxic bile acids, other mechanisms of action include cryoprotection of the injured bile duct epithelial cells (cholangiocytes) against toxic effects of bile acids, inhibition of apoptosis of hepatocytes, immunomodulatory effects, and stimulation of bile secretion by hepatocytes and cholangiocytes.

Indications

Pritli is indicated for the treatment of **Primary Biliary Cirrhosis (PBC)**.

Dosage and Administration

Recommended adult dosage: 13-15 mg/kg/day administered in two to four divided doses with food.

Contraindications

Known hypersensitivity or intolerance to Ursodeoxycholic Acid or any of the components of the formulation.

Precautions

Patients with variceal bleeding, hepatic encephalopathy, ascites, or in need of an urgent liver transplant, should receive appropriate specific treatment.

Side Effects

Abdominal discomfort, abdominal pain, alopecia, diarrhea, nausea, pruritus, and rash.

Pregnancy and Lactation

There are no adequate or well-controlled studies in pregnant women and this drug should be used during pregnancy only if needed. It is not known whether Ursodeoxycholic Acid is excreted in human milk. Since many drugs are excreted in human milk, caution should be exercised when Ursodeoxycholic Acid is administered to a nursing mother.

Drug Interactions

Ursodeoxycholic Acid should not be used with drugs, such as estrogenic hormones that increase bile cholesterol. Concomitant administration with bile-acid binding drugs including antacids, charcoal and cholestyramine should be avoided since this may reduce the effectiveness of therapy with Ursodeoxycholic Acid.

Overdose

The most severe manifestation of overdosage would likely consist of diarrhea that should be treated symptomatically and should be communicated to the doctor.

Storage

Store in a cool and dry place below 25°C, protected from light. Keep out of the reach of children.

How Supplied

Pritli 150 Tablet: Each box contains 30 Tablets in the Alu-PVdC blister pack.

Pritli 300 Tablet: Each box contains 20 Tablets in the Alu-PVdC blister pack.



উপাদান

প্রিটলি ১৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড ফার্মা ইউরোপ ১৫০ মি.গ্রা.

প্রিটলি ৩০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড ফার্মা ইউরোপ ৩০০ মি.গ্রা.

ফার্মাকোলজি

আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড পানিতে দ্রবনীয় একটি বাইল এসিড যা প্রাকৃতিকভাবেই লিভারে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোলেস্ট্যাটিক লিভার রোগে পানিতে অদ্রবনীয় বাইল এসিড এর পরিমাণ বাড়তে থাকে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড সেবনের মাধ্যমে এই অদ্রবনীয় বাইল এসিড এর পরিমাণ কমতে থাকে। এছাড়াও আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড পিত্ত নালীকে বাইল এসিডের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে, যকৃত কোষের সুরক্ষা এবং এখান থেকে পিত্ত নিঃস্বরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

নির্দেশনা

প্রিটলি প্রাথমিক বিলিয়ারি সিরোসিস এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ওজনের অনুপাতে ১৩-১৫ মি.গ্রা. হিসেবে দিনে দুই থেকে চারবার পর্যন্ত সেবন করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা

আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড এর প্রতি গুরুতর সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস থাকলে সেক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

সাবধানতা

ডেরিসাল রক্তক্ষরণ, অ্যাসাইটস (তরল জমে পেট ফুলে যাওয়া), হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি এইধরনের লিভার জটিলতায় সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণত যে সকল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হল ডায়রিয়া, বমি ভাব, পেটে অস্বস্তি, চুল পড়ে যাওয়া এবং র্যাশ।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া যায়নি তাই একেবারে প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। বুকের দুধের সাথে নিঃসৃত হয় কিনা তাও জানা যায়নি তাই স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত।

অন্যান্য ওষুধের সাথে মিথক্রিয়া

পিণ্ডের কোলেস্টেরল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা ইস্ট্রোজেনিক হরমোন, এন্টাসিড, চারকোল এবং কোলেস্টাইরামাইন ইত্যাদি ওষুধের সাথে আর্সোডিঅক্সিকোলিক এসিড ব্যবহার করা উচিত নয়।

মাত্রাধিক্য

অধিক মাত্রায় সেবন করলে ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে এক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

প্রিটলি ১৫০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে অ্যালু-পিভিডিসি ব্লিস্টার প্যাকে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

প্রিটলি ৩০০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে অ্যালু-পিভিডিসি ব্লিস্টার প্যাকে আছে ২০ টি ট্যাবলেট।